

## Fonction dérivée

> Calculer la dérivée d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 3

**Exercice n°1** Pour chaque fonction  $f$  suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ , déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour tout réel  $x$ .

$$f(x) = 8x$$

$$f(x) = -\frac{1}{2}x$$

$$f(x) = -x$$

**Exercice n°2** Pour chaque fonction  $g$  suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ , déterminer l'expression de  $g'(x)$  pour tout réel  $x$ .

$$g(x) = -2x + 9$$

$$g(x) = 0, 2x - 1, 1$$

$$g(x) = \frac{-3}{2}x - 1$$

**Exercice n°3** Pour chaque fonction  $h$  suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ , déterminer l'expression de  $h'(x)$  pour tout réel  $x$ .

$$h(x) = 6x^2$$

$$h(x) = -5x^2$$

$$h(x) = \frac{5}{3}x^2$$

**Exercice n°4** Pour chaque fonction  $f$  suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ , déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour tout réel  $x$ .

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1$$

$$f(x) = -5x^2 - x + 9$$

$$f(x) = x^2 + 5x$$

**Exercice n°5** Pour chaque fonction  $g$  suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ , déterminer l'expression de  $g'(x)$  pour tout réel  $x$ .

$$g(x) = x^3$$

$$g(x) = -2x^3$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x^3 + 1$$

**Exercice n°6** Pour chaque fonction  $h$  suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ , déterminer l'expression de  $h'(x)$  pour tout réel  $x$ .

$$h(x) = x^3 - x^2 + x$$

$$h(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x$$

$$h(x) = -x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$$

**Exercice n°7** Pour chaque fonction  $f$  suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ , déterminer l'expression de  $f'(t)$  pour tout réel  $t$ .

$$f(t) = -2t^3 + 8t^2 + \sqrt{2}t + 3$$

$$f(t) = t(t - 3)(t + 1)$$

$$f(t) = (2t - 4)^2$$

## &gt; Tangente à une courbe en un point

**Exercice n°8** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $t \mapsto 2t^2$ .

1. Déterminer l'expression de  $f'(t)$  pour tout réel  $t$ .
2. Calculer  $f'(-1)$ .
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de  $f$  au point d'abscisse  $-1$ .

**Exercice n°9** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -x^3 + 1$ .

1. Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour tout réel  $x$ .
2. Calculer  $f'(2)$ .
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de  $f$  au point d'abscisse  $2$ .


**Exercice n°10** Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = 5x^3 + 9x^2 + 8x + 2$ .

Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de  $g$  au point d'abscisse  $-1$ .

**Exercice n°11**


On donne ci-contre un extrait de la courbe représentative de  $f : x \mapsto x^3 - 2x^2$  notée  $\mathcal{C}_f$ .

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $1$ .
2. Tracer cette tangente dans le repère ci-contre.



## &gt; Sens de variation et extremum

**Exercice n°12** On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction  $f$  définie sur  $[-5 ; 3]$ .



1. Établir le tableau de signes de  $f(x)$  sur  $[-5 ; 3]$ .
2. Établir le tableau de variations de  $f$  sur  $[-5 ; 3]$ .

**Exercice n°13** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 2x - 4$ .

1. Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour tout réel  $x$ .
2. Établir le tableau de variations de  $f$  sur son ensemble de définition.

**Exercice n°14** Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g : t \mapsto -3t^2 - 4t + 2$ .

1. Déterminer l'expression de  $g'(t)$  pour tout réel  $t$ .
2. Établir le tableau de variations de  $t$  sur son ensemble de définition.
3. Quel est le maximum de  $f$  sur son ensemble de définition et en quel réel est-il atteint ?

**Exercice n°15** Soit  $g$  la fonction définie sur  $[-1 ; 6]$  par  $g : x \mapsto 5(x - 3)^2 + 1$ .

1. Déterminer l'expression de  $g'(x)$  pour tout réel  $x$ .
2. Établir le tableau de variations de  $g$  sur son ensemble de définition.
3. Quel est le minimum de  $g$  sur son ensemble de définition et en quel réel est-il atteint ?


**Exercice n°16** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 45x + 20$ .

1. Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour tout réel  $x$ .
2. Montrer que pour tout  $x$  dans  $\mathbb{R}$ , on a  $f'(x) = 3(x + 3)(x - 5)$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Établir le tableau de variations de  $f$  sur son ensemble de définition.

**Exercice n°17** Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g : t \mapsto -\frac{2}{3}t^3 - 6t^2 + 14t - 1$ .

1. Déterminer l'expression de  $g'(t)$  pour tout réel  $t$ .
2. Montrer que pour tout réel  $t$  on a  $g'(t) = -2(t - 1)(t + 7)$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur son ensemble de définition.

**Exercice n°18** Jean-Kevin souhaite créer un potager rectangulaire le long du mur de sa maison.



Le potager devra avoir la plus grande surface possible. Pour cela, il dispose de 15 m de grillage pour clôturer les trois côtés (le quatrième étant le mur).

Les nombres  $x$  et  $y$  sont les dimensions, en mètre, du potager comme indiqué sur la figure ci-dessus qui n'est pas à l'échelle.


1. À quel intervalle appartiennent les nombres  $x$  et  $y$  ?
2. Montrer que  $y = 15 - 2x$ .
3. En déduire une expression de l'aire du potager en fonction de  $x$ .
4. Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0 ; 7,5]$  par  $f : x \mapsto -2x^2 + 15x$ .

- Calculer  $f'(x)$  pour tout  $x$  dans  $[0 ; 7,5]$ .
- Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $[0 ; 7,5]$ .
- En déduire que la fonction  $f$  admet un maximum sur  $[0 ; 7,5]$ . Donner la valeur de ce maximum et la valeur du réel pour lequel il est atteint.
- En déduire les dimensions du potager de Jean-Kevin.

### Exercice n°19

Un joueur de rugby se situe à une distance de 20 mètres des poteaux.

Il souhaite que le ballon passe au dessus de la barre située à 3 mètres du sol. La trajectoire du ballon peut être modélisée par la fonction  $h$  définie par  $h(x) = ax^2 + bx + c$  où  $x$  représente la distance (en m) parcourue par le ballon et  $h(x)$  la hauteur (en m) du ballon.



- Quelle semble être la hauteur maximale atteinte par le ballon ? Au bout de combien de mètres parcourus par le ballon cette hauteur maximale semble-t-elle atteinte ?
- On admet que pour tout réel  $x$  de l'intervalle  $[0 ; 25]$ ,  $h(x) = -0,04x^2 + x$ . Calculer  $f'(x)$  pour tout réel  $x$  de  $[0 ; 25]$ .
- Dresser le tableau de variations de  $h$  sur son intervalle de définition.
- Quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon ? Pour quelle valeur de  $x$  cette hauteur est-elle atteinte ?
- On rappelle que les poteaux se situent à 20 m du joueur ayant effectué le tir. Quelle est la hauteur du ballon à cet endroit ?
- Le joueur a-t-il réussi son tir ?

### Exercice n°20

Un laboratoire pharmaceutique produit et commercialise un médicament. Il peut fabriquer de 5 à 30 kg de ce médicament par semaine.

Le bénéfice réalisé par l'entreprise, c'est à dire la différence entre la recette et le coût de production, est exprimé en euros et modélisé par la fonction  $B$  définie sur  $[5 ; 30]$  par

$$B(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 11x^2 - 40x - 72$$

- Déterminer une expression de  $B'(x)$  pour tout réel  $x$  dans  $[5 ; 30]$ .
- Montrer que pour tout réel  $x$  on a  $B'(x) = -(x - 2)(x - 20)$ .
- Dresser le tableau de variations de  $B$  sur  $[5 ; 30]$ .

2. On considère que la production est entièrement vendue. Déterminer la quantité à produire pour réaliser un bénéfice maximum. Quelle est la valeur de ce bénéfice ?
3. Le service de commercialisation du laboratoire a fixé un objectif de vente entre 15 kg et 24 kg pour la semaine à venir. Quel est le bénéfice minimum envisageable ?

### Exercice n°21

Une entreprise produit des pizzas surgelées.

On suppose qu'elle vend toute sa production par lots de 25 pizzas à la grande distribution.

L'entreprise produit entre 10 lots et 100 lots par jour.

Le prix de vente d'un lot est fixé à 78,50€. On estime que le coût total par jour de production est donné par la fonction  $C$  définie sur  $[10 ; 100]$  par

$$C(x) = 0,02x^3 - 2,5x^2 + 116x + 880$$

où  $x$  désigne le nombre de lots fabriqués.

#### Partie A : Le coût marginal

1. Calculer  $C'(x)$  pour tout réel  $x$  de l'intervalle  $[10 ; 100]$ .
2. On sait que le coût marginal  $C_m(x)$  peut être assimilé à  $C'(x)$ . On pose alors  $C_m(x) = C'(x)$ .
  - (a) Calculer  $C'_m(x)$ .
  - (b) Étudier les variations de la fonction  $C_m$  sur  $[10 ; 100]$ .
3. On donne ci-dessous la représentation graphique de la fonction  $C_m$  sur  $[10 ; 100]$ .



Il est intéressant pour l'entreprise de continuer à produire tant que le coût marginal est inférieur au prix de vente. Tracer, sur la représentation graphique ci-dessus, la droite d'équation  $y = 78,50$ .


En déduire graphiquement jusqu'à quelle valeur de  $x$  il est intéressant pour l'entreprise de continuer à produire.

#### Partie B : Étude du bénéfice

On pose  $R(x) = 78,5x$  la recette, en euros, pour  $x$  lots vendus.

Le bénéfice  $B(x)$ , pour  $x$  lots fabriqués et vendus, est la différence entre la recette et le coût de production. On pose ainsi  $B(x) = R(x) - C(x)$ .

Les courbes représentatives des fonctions  $C$  et  $R$  sont données sur la page suivante.



1. Par lecture graphique, estimer la valeur de  $x$  pour laquelle le bénéfice est maximal.
2. (a) Déterminer l'expression de  $B(x)$  pour tout réel  $x$ .  
(b) Calculer  $B'(x)$ .  
(c) Montrer que pour tout réel  $x$  on a  $B'(x) = (-0,06x + 0,5)(x - 75)$ .  
(d) Dresser le tableau de variations de  $B$  sur  $[10 ; 100]$ .  
(e) Pour quelle valeur de  $x$  le bénéfice est-il maximal ? Quel est ce bénéfice ?